




Pertama
di Indonesia

Clinafarm[®]

DESINFEKTAN FUNGISIDAL



Gb. Kepala konidia Aspergillus



Clinafarm Spray



Clinafarm Smoke

Cegah sedini mungkin kerugian karena jamur !!!



JANSSEN
ANIMAL HEALTH

Clinafarm®



Clinafarm Spray

Digunakan untuk area yang terbuka seperti di kandang, hatchery, ruang mesin atau mencuci peralatan kandang. Dapat juga untuk desinfeksi kolam renang, seuna dan gedung olah raga.

Komposisi :

- Enilconazole 150 gr
- docusate sodium 450 gr
- benzyl alcohol 100 gr
- macrogol casto oil 300 gr

Dosis dan Cara Pemakaian

- Semprot : 1 lt Clinafarm di tambah 99 ltr. air untuk luas 7.500 m²
- Pengkabutan : 1 lt Clinafarm di tambah 99 ltr. air untuk ruangan 30.000 m³

Sifat dan Karakteristik :

- Dapat diaplikasikan dengan semprot, nebulasi dan fogging
- Tidak toxic untuk manusia dan hewan (aman)
- Tidak korosif
- Dapat dicampur dengan deterjen maupun desinfektan
- Shelf life 5 tahun pada kondisi normal untuk Clinafarm Spray
- Shelf life 2 tahun untuk Clinafarm Smoke



Clinafarm Smoke

Digunakan untuk area yang tertutup seperti pada feed silo, inkubator, truk, kontainer atau pada area tertutup dengan sistem ventilasi yang baik. Dapat juga untuk mendesinfeksi ruangan khusus di rumah sakit (laboratorium dsb), Industri Makanan dan Minuman

Komposisi :

- Enilconazole 15 %
- lactose 14%
- magnesium silicate 57%
- pottasium chlorate 14%

Dosis dan Cara Pemakaian

- 1 Clinafarm Smoke generator digunakan untuk ruangan seluas 50 m³
- Taruh di tempat yang tahan api dan nyalakan Clinafarm Smoke. Asap putih akan keluar selama 20-40 detik dari generator
- Biarkan smoke generator selama 5 menit agar dingin, Biarkan asap mengasapi ruangan minimum 30 menit dan sebaiknya 12 jam (overnight)

CLINAFARM REFERENCE PROGRAMME

Breeding Farm

Untuk kandang : litter, sarang, dinding dan lantai kandang serta tempat penetasan sebaiknya disemprot 2X per bulan Sedangkan untuk tempat telur disemprot setiap minggu sekali.

Dosis : 1 lt Clinafarm spray ditambah 50 lt air
(1 lt campuran digunakan untuk luas area 75m²)

Hatchery

Untuk program pemakain di hatchery, gunakan dosis :
1 lt Clinafarm spray ditambah 99 lt air
1 lt campuran untuk luas area 75m² atau 300 m³

- Pada ruang pull chick, keranjang kosong atau peralatan : Semprot / perlengkapan beberapa kali setelah dipakai.
- Pada ruang inkubasi dan ruang penetasan : Semprot/ pengkabutan 2 kali / minggu.
- Pada ruang inkubator : Semprot/ pengkabutan beberapa kali sesudah telur masuk.
- Pada ruang tempat penetasan (hatcher) : Semprot / pengkabutan beberapa kali sesudah DOC dikeluarkan. Atau 1 kaleng Clinafarm smoke per hatcher 12 jam sebelum pull chick.
- Pada kendaraan pengangkutan telur : Semprot / pengkabutan telur sebelum diberangkatkan. Atau 1 kaleng Clinafarm smoke per 50 m³ sebelum truk tersebut ditutup.

Pemegang Pendaftaran dan Distributor

PT NOVINDO AGRITECH HUTAMA
Duta Mas Fatmawati Blok A1/39
Jl. RS. Fatmawati No. 39 Cipete Utara, Kebayoran Baru - Jakarta 12150
Telp. : (021) 724 5986, 727 90616 Fax. : (021) 722 0373
Website : www.novindo.co.id

