


MEDICOX solution

Kontrol (pencegahan dan pengobatan) Coccidiosis pada unggas.

Feature & Benefit:

- Medicox solution bekerja dengan sangat efisien pada semua stadium perkembangan intraseluler coccidia
- Spektrum aktivitas Medicox solution sangat luas sehingga sangat efektif terhadap semua spesies Eimeria pada unggas
- Medicox solution menunjukkan efikasi yang sangat cepat, hanya perlu diberikan selama 2 hari
- Medicox solution sangat aman
- Medicox solution cocok dikombinasikan dengan semua Feed Additive dan medikasi pada pakan yang umumnya dipakai pada industri perunggasan
- Medicox solution dalam bentuk larutan sehingga sangat mudah diberikan lewat air minum
- Medicox solution mempunyai stabilitas yang baik selama dilarutkan kedalam air minum.





Dosis Dan Penggunaan:

Larutkan dalam air minum dengan perbandingan 1 ml/ liter air minum atau 0,28 ml per kg BB, berikan selama 2 hari. Jika diperlukan, 5 hari kemudian diberikan kembali selama 2 hari. Pada kasus dimana Coccidiosis terjadi di banyak lokasi, dianjurkan untuk memberikan Medicox Solution kira-kira 3 hari sebelum estimasi kejadian.

⚠ Perhatian:

- Hentikan pengobatan 16 hari sebelum dipotong untuk keperluan konsumsi manusia.
- Jangan digunakan pada ayam layer yang sedang produksi (laying periode)
- Hati-hati jangan kontak dengan mata dan kulit selama penggunaan, cuci segera dengan air bersih jika kontak.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Pengobatan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan.



DEPTAN'R) No. 1.08083486 PKC

Komposisi:

Setiap liter mengandung:
Toltrazuril 25 g

Kemasan:

1 liter

PT. Indovetraco Makmur Abadi
Telp. (021) 64701200 (hunting)
(021) 64701176 (direct line)